



台灣萌蒂藥品有限公司
台北市信義區松仁路32號14樓
Taiwan Mundipharma Pharmaceuticals Ltd.
14F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City
110, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2 8729 7588
Fax. +886 2 2720 2658

台灣萌蒂藥品有限公司 函

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國 106 年 8 月 1 日

發文字號：萌藥(106)字第 082 號

主旨：本公司產品「必達定殺菌口腔噴液 (衛部藥輸字第 026339 號) 50 毫升/瓶」外盒及仿單變更通知，詳如說明。

說明：

- 一、 本公司產品「必達定殺菌口腔噴液 (衛部藥輸字第 026339 號) 50 毫升/瓶」之外盒及仿單依衛生福利部部授食字第 1051402838 號公告進行變更：
 1. 自批號 17F273S33 起使用新版外盒及仿單，瓶身標籤未變更。
 2. 變更前後之對照表及詳細圖檔，請見附件。檢附圖檔比例非實際大小，僅供內容變更參考用。
 3. 該產品於不同通路之產品外盒顏色不同，但文字內容完全相同，請查照。
- 二、 另，於上述公告內容載明，依據該公告進行變更核備前製造或輸入之產品，無須回收，特此說明。

正本：各醫院

副本：中華民國藥師公會全國聯合會、社團法人台灣臨床藥學會、台灣年輕藥師協會



台灣萌蒂藥品有限公司
貝 斯 特



台灣萌蒂藥品有限公司
 台北市信義區松仁路32號14樓
 Taiwan Mundipharma Pharmaceuticals Ltd.
 14F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City
 110, Taiwan (R.O.C.)
 Tel. + 886 2 8729 7588
 Fax. + 886 2 2720 2658

必達定殺菌口腔噴液 (衛部藥輸字第 026339 號) 外盒及仿單新舊比較表

項目	舊	新
外盒	<p>舊包裝設計，包含產品名稱、劑型、成分、用法用量、注意事項及公司資訊。包裝設計較為傳統，文字排列較為分散。</p>	<p>新包裝設計，在保留原有資訊的同時，更新了部分內容，如「其他成分(僅外銷)」和「【備註】」部分。包裝設計更為現代化，資訊呈現更為清晰。</p>

舊版外盒



50ml
殺菌口腔噴液
必達定®

BETADINE®
Healthy healing starts with

Healthy healing starts with
BETADINE®

throat
spray



BACTERIA
VIRUSES
FUNGI

► Fast kills bacteria, fungi & viruses

Contains an active
ingredient povidone-
iodine 0.45% w/v



50ml

必達定®
殺菌口腔噴液

適應症：
口腔消毒殺菌

用法用量：
• 直接噴液2~3下於疼痛及發炎的部位。
• 每3~4小時重複一次，一天數次適量使用。

有效成分：
Povidone-Iodine 0.45% w/v



4 719871 150122

BETADINE®

必達定®
殺菌口腔噴液



BACTERIA
VIRUSES
FUNGI



50ml

BETADINE®

必達定®
殺菌口腔噴液
50ml

必達定®
殺菌口腔噴液

製造廠：
Mundipharma Pharmaceuti-
cals Ltd.
13, Othellos Str., Dhall
Industrial Zone, P.O.
Box 23661, 1685
Nicosia, Cyprus
歐洲：賽普勒斯

進口商：
台灣萌葎藥品有限公司
臺北市信義區松仁路32號14樓
服務電話：0800-854-888

醫師藥師藥劑生指示藥品
許可證字號（衛部藥輸字第
026339號）

LOT*
MAN*
EXP*

必達定® BETADINE®
商標為Mundipharma AG註冊登記

BTS50-BX-160125-1



舊版外盒



50ml
殺菌口腔噴液
必達定[®]
BETADINE[®]
Healthy healing starts with

Healthy healing starts with
BETADINE[®]

throat
spray

 **BACTERIA
VIRUSES
FUNGI**

► Fast kills bacteria, fungi & viruses

Contains an active ingredient povidone-iodine 0.45% w/v



50ml

必達定[®]
殺菌口腔噴液

適應症：
口腔消毒殺菌

用法用量：
•直接噴液2~3下於疼痛及發炎的部位。
•每3~4小時重複一次，一天數次適量使用。

有效成分：
Povidone-Iodine 0.45% w/v



4 719871 150023

BETADINE[®]

必達定[®]
殺菌口腔噴液

 **BACTERIA
VIRUSES
FUNGI**



50ml

BETADINE[®]

必達定[®]
殺菌口腔噴液
50ml

必達定[®]
殺菌口腔噴液

製造廠：
Mundipharma Pharmaceuticals Ltd.
13, Othellos Str., Dhall Industrial Zone, P.O. Box23661,1685 Nicosia, Cyprus
歐洲：賽普勒斯

進口商：
台灣明蒂藥業有限公司
臺北市松仁路32號14樓
服務電話：0800-854-888

醫師藥師藥劑生指示藥品
許可證字號（衛部藥輸字第026339號）

必達定[®]BETADINE[®]
商標為Mundipharma AG註冊登記

10330903

PHA-37B

新版外盒

50ml
殺菌口腔噴液
必達定[®]
BETADINE[®]
Healthy healing starts with

Healthy healing starts with
BETADINE[®]

throat
spray



BACTERIA
VIRUSES
FUNGI

- 有效成分及含量：
Povidone-Iodine 0.45% w/v
- 其他成分(賦形劑)：Glycerin, Ethanol, Menthol, Eucalyptus oil, Potassium Iodide, Purified Water
- 用途(適應症)：口腔消毒殺菌。
- 不得使用族群
①對碘或本藥成分過敏的人。
②有甲狀腺疾病的人。 →

Contains an active ingredient povidone-iodine 0.45% w/v



50ml

必達定[®]
殺菌口腔噴液

- ③接受放射性碘治療之前四週與之後。
- ④進行診斷性甲狀腺檢查前後1~2週內。
- ⑤進行放射性碘核醫顯影檢查。
- ⑥正在服用鋰劑的人。
- ⑦未滿6歲之兒童。

•用法用量

六歲以上

局部(口腔與喉嚨)使用

直接噴液2~3下於疼痛及發炎的部位，每3-4小時重複一次，每天可使用數次，或依照醫師或牙醫指示。

未滿六歲請勿使用

- 若您忘記使用藥物，請儘快使用，再依照原先使用時間使用。但若已經接近下次使用的時間，則跳過不用，下次恢復正常時間使用。
- 治療時間應由您的醫師依據您的情況決定。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】0800-854-888
衛部藥輸字第026339號



BTS50-BX-160125-1

BETADINE[®]

必達定[®]
殺菌口腔噴液



BACTERIA
VIRUSES
FUNGI



50ml



BETADINE[®]

必達定[®]
殺菌口腔噴液
50ml

產地：歐洲

製造廠
製造廠名稱：Mundipharma
Pharmaceuticals Ltd
製造廠地址：13, Othellos
Str., Dhali Industrial Zone,
P.O. Box 23661, 1685
Nicosia, Cyprus

國內持有者藥商

藥商名稱：
台灣萌蒂藥品有限公司
藥商地址：
臺北市信義區松仁路32號14樓



LOT*
MAN*
EXP*

必達定[®] BETADINE[®]
商標為Mundipharma AG註冊登記

新版外盒



50ml
殺菌口腔噴液
必達定
BETADINE®
Healthy healing starts with

BTS50-BX-160125-1

BETADINE®
必達定
殺菌口腔噴液
50ml

Healthy healing starts with
BETADINE®

throat
spray

必達定
殺菌口腔噴液

BETADINE®
必達定
殺菌口腔噴液

必達定
殺菌口腔噴液

產地：歐洲

製造廠
製造廠名稱：Mundipharma
Pharmaceuticals Ltd
製造廠地址：13, Othellos
Str., Dhali Industrial Zone,
P.O. Box 23661, 1685
Nicosia, Cyprus

 **BACTERIA
VIRUSES
FUNGI**

•有效成分及含量：
Povidone-Iodine 0.45% w/v

•其他成分(賦形劑)：Glycerin,
Ethanol, Menthol, Eucalyptus
oil, Potassium Iodide,
Purified Water

•用途(適應症)：口腔消毒殺菌。

•不得使用族群
①對碘或本藥成分過敏的人。
②有甲狀腺疾病的人。 →

Contains an active
ingredient povidone-
iodine 0.45% w/v
 50ml

- ③接受放射性碘治療之前四週與之後。
- ④進行診斷性甲狀腺檢查前後1~2週內。
- ⑤進行放射性碘核醫顯影檢查。
- ⑥正在服用鐳劑的人。
- ⑦6歲以下兒童。

•用法用量
六歲以上
局部(口腔與喉嚨)使用
直接噴液2~3下於疼痛及發炎的部位，每3~4小時重複一次，每天可使用數次，或依照醫師或牙醫指示。
未滿六歲請勿使用
•若您忘記使用藥物，請儘快使用，再依照原先使用時間使用。但若已經接近下次使用的時間，則跳過不用，下次恢復正常時間使用。
•治療時間應由您的醫師依據您的情況決定。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】0800-854-888
衛部藥輸字第026339號



 **BACTERIA
VIRUSES
FUNGI**


50ml



國內持有者藥商
藥商名稱：台灣萌蒂藥業有限公司
藥商地址：臺北市信義區松仁路32號14樓



必達定® BETADINE®
商標為Mundipharma AG註冊登記

10330904

PHA-37B

舊版仿單

一般消費者用

必達定® 殺菌口腔噴液 BETADINE® Throat Spray

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛部藥輸字第026339號

本仿單載有重要須知，請詳讀仿單內容。若您需要進一步資訊，請洽詢醫師或藥師。
您可能需要再次閱讀本仿單，因此請妥善保存。

成分：

主成分：Povidone-Iodine 0.45% w/v

賦形劑：甘油、薄荷醇、尤加利精油、乙醇、碘化鉀、純水

藥物劑型：口腔噴液劑

包裝：必達定殺菌口腔噴液為口用液劑，外觀呈滑順黃棕色液體，裝在附有白色噴閥與聚乙烯透明蓋子的淡黃色聚乙烯容器中，容量為 50 毫升。
產品係裝入印製紙盒中。

藥物類別：消毒劑

關於此藥物，您必須瞭解：

1. 治療適應症

為什麼要使用必達定殺菌口腔噴液？

口腔消毒殺菌。

2. 禁忌症

什麼時候不該使用必達定殺菌口腔噴液？

- 若您對碘或仿單前段所述的任何其他成分過敏，則請勿使用。
- 請勿用於甲狀腺功能異常者（特別是膠狀體結節性甲狀腺腫大、地域性甲狀腺腫大及橋本氏甲狀腺炎患者）。
- 不得用於正在使用鋰鹽的患者。
- 不得用於未滿 6 歲的兒童。

3. 使用注意事項：

使用本產品時，應該注意哪些事項？

- 對已知具有腎功能障礙者規律用於破損皮膚時，應特別注意。
- 使用含碘產品可能會影響甲狀腺功能檢驗結果。
- 除非經嚴格指示，否則請勿將 povidone-iodine 長時間用於大面積皮膚（例如：不得超過總體表面積的 10%，且不得超過 14 天）。完成治療後（3 個月內）均應注意是否出現甲狀腺功能亢進的早期症狀，並於必要時監測甲狀腺功能。
- 各種偵測糞便潛血或尿血檢驗受到 povidone iodine 污染時，將造成偽陽性結果。
- 懷孕與授乳期間：必達定殺菌口腔噴液僅可作為處方藥物使用。
- 對於駕駛與使用機械能力之影響：目前尚無相關影響報告。

4. 交互作用：

必達定殺菌口腔噴液是否會影響其他治療的效果？

- 同時使用含碘成分、過氧化氫、銀與 tauridine 的產品將可能導致所有產品的效果受到影響。
- 同時使用含汞產品時，可能形成足以破壞黏膜的物質。
- 使用此療法可能會影響檢驗結果或甲狀腺功能，並對碘劑等甲狀腺治療造成影響。結束治療後，請等待至少 1-2 週再行實施閃爍掃描檢查 (scintigram)。
- 多種偵測糞便潛血（無法以肉眼看見）或尿血檢驗可能受到影響（造成偽陽性結果）。

5. 使用說明：

如何使用必達定殺菌口腔噴液？

成人、老人及 6 歲以上兒童：局部（口腔與咽喉）使用

- 直接噴液 2-3 下於疼痛及發炎的部位，每 3-4 小時重複一次，每天可使用數次，或依照醫師或牙醫指示。
- 若您忘記使用藥物，請儘快使用，再依循原先時程。但若已屆下次使用的時間，則無須補足使用次數。
- 治療時間應由您的醫師依據您所經歷問題的適應症決定。

6. 用藥過量、臨床症狀、治療

若不慎誤食必達定殺菌口腔噴液該怎麼辦？

若不慎或有著意攝食大量必達定殺菌口腔噴液之情況，請立即與您的醫師或鄰近醫院聯絡。

用藥過量可能引發口中金屬味、唾液增加、口腔或咽喉燒灼或疼痛、眼部刺激與腫脹、因肺水腫導致呼吸困難、皮膚反應、胃腸不適與腹瀉、代謝性酸中毒、高血鈉症，並可能導致腎功能障礙。

治療：應就症狀給予支持性治療，並應特別留意電解質平衡及腎臟與甲狀腺功能。

7. 副作用

本產品可能造成哪些不良作用？

Povidone-iodine 比純碘更不具刺激性，但仍可能引發局部皮膚反應。本產品也可能會對口腔造成刺激與過敏反應。若您經歷任何上述副作用或任何其他異常反應，請停用藥物，並立即徵詢醫師或藥師的意見。

對大型傷口或嚴重燒傷使用 povidone-iodine 後，可能引發如代謝性酸中毒、高血鈉症及腎功能障礙等全身性不良作用。先前曾通報急性全身性過敏反應的病例，其徵象與症狀包括血壓下降及/或呼吸短促（全身性過敏反應）。

8. 儲存注意事項：

如何保存必達定殺菌口腔噴液？

- 請將本產品置入原包裝，並保存於 25°C 以下環境。
- 若本產品已屆包裝所印保存期限，請勿使用。
- 請遠離兒童可觸及之處。

製造廠

製造廠名稱：Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

製造廠地址：13, Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus

國內持有者藥商

藥商名稱：台灣萌蒂藥品有限公司

藥商地址：臺北市信義區松仁路 32 號 14 樓

TW #026339-PIL v2

10215603

10215603v01

必達定[®]殺菌口腔噴液

BETADINE[®] Throat Spray

醫師藥劑生指示藥品
衛部藥輸字第026339號

1. 定性與定量成分：Povidone-iodine Ph. Eur. 0.45% w/v

2. 劑型：口腔噴液劑。

3. 臨床特性

3.1 適應症：口腔消毒殺菌

3.2 用法用量

投藥途徑：局部（口腔與喉嚨）。

直接噴液2-3下於疼痛及發炎的部位，每3-4小時重複一次，一天數次適量使用，或依照醫師或牙醫指示。

3.3 禁忌：已知對碘或povidone或「藥物特性」一節所列之任何其他賦形劑過敏者，不可使用。甲狀腺機能亢進、其他甲狀腺疾病，以及因甲狀腺機能亢進而接受放射性碘治療之前與之後，皆不可使用，除非已獲持久的痊癒。在進行放射性碘閃爍顯影檢查（scintigraphy）或以放射性碘治療甲狀腺癌之前4週內，不可使用。有甲狀腺腫、甲狀腺結節或其他甲狀腺疾病的病患（尤其老年病患）使用大量碘劑時，會有發生甲狀腺機能亢進的風險。正在服用鋰劑的病患，不可使用。6歲以下的兒童，不可使用。

3.4 特殊警語及使用注意事項

- 除非絕對需要，否則不可長時間在大範圍皮膚上施用povidone-iodine（亦即，不超過總體表面積的10%，且不可超過14天）。即使在治療結束後（最久3個月），亦須注意是否出現甲狀腺機能亢進的早期症狀，必要時應進行甲狀腺功能監測。
- 腎功能不全的病患，若具有皮膚破損，必須特別小心，避免皮膚暴露於本產品。
- 限用於口腔與喉嚨。
- 若出現局部刺激不適或敏感，請停止使用。請儲存於兒童無法取得之處。

3.5 與其他藥品的交互作用以及其他形式的交互作用

- PVP-Iodine複合劑在pH值2.0至7.0之間具有功效。此複合劑可與蛋白質和其他不飽和有機化合物產生反應，因而導致功效降低。
- 與含有酵素成分、過氧化氫、銀與牛磺羅定（taurolidine）的產品同時使用時，可能導致兩種物質的效用皆減弱。
- 與含汞產品同時使用時，可能會形成一種可損傷皮膚的物質。
- 使用本產品治療，可能會干擾某些檢測結果或甲狀腺功能，因而無法進行以碘治療甲狀腺的規劃。在治療結束之後，應至少等候1至2週，才可進行閃爍顯影（scintigram）顯影檢測。
- 用於偵測糞便潛血或尿液的數種檢測受到povidone-iodine污染時，則可能產生假陽性結果。

3.6 懷孕與授乳：在懷孕與授乳期間，必達定殺菌口腔噴液僅能在醫師的嚴格處方下使用，且其使用必須維持在絕對低量，因為被吸收後的碘可通過胎盤屏障，亦可分泌至乳汁中。Povidone-iodine可能引發胎兒或新生兒的暫時性甲狀腺機能低下，因此必須避免在這些狀況使用。此時，必須檢查兒童的甲狀腺功能，尤其在已知有地區性膳食碘過低以及有甲狀腺腫傾向的地區。同時，應絕對避免嬰兒誤食本口腔噴液的任何可能性。

3.7 對開車與機器操作能力的影響：無已知事例。

3.8 不良作用：必達定殺菌口腔噴液可能導致口腔黏膜刺激不適與過敏反應。若出現局部刺激不適或敏感，請停止使用。

3.9 用藥過量：在蓄意或意外食入大量povidone-iodine時，會出現急性碘中毒性，其症狀包括，腹部症狀、無尿症、循環衰竭、導致窒息的聲門水腫或肺水腫與代謝異常。應提供症狀與支持性治療。透析治療可有效移除碘離子，在嚴重病患，例如已發生腎衰竭時應提供透析治療。持續性血液過濾(CVVH)效果較一般血液透析差。

4. 藥理性質

4.1 藥效學性質

Povidone-iodine為聚合物polyvinylpyrrolidone與碘的複合劑（Povidone-Iodine），在使用之後，可在一段時間內持續釋放碘。已知碘元素（I₂）為高度有效的殺微生物藥物，在體外可快速殺死細菌、病毒、真菌與一些原蟲。其作用機轉有二：游離態碘可快速殺死微生物，而與聚合物結合的碘，則為碘的儲庫。當本劑劑與皮膚及黏膜接觸時，從聚合物解離的碘會漸增。游離態碘會與微生物的酵素與構造蛋白之胺基酸上可被氧化的-SH與-OH產生作用，因而破壞這些酵素與蛋白質。在體外實驗中，大部分活動性微生物可在不到一分鐘內被殺死，許多可在15至30秒內被破壞。在此過程中，碘會褪色；因此，棕色的深度可作為其有效性的指標，可能需在褪色後重複用藥。尚無抗藥性的報告。

4.2 藥物動力學性質

- 吸收：正常人於局部使用本產品時，全身性碘的吸收量極低。本產品僅供口腔與喉嚨局部使用。
 - Povidone (PVP)：Povidone的吸收與腎臟清除狀況，係視混合劑的（平均）分子量而定。分子量超過35,000至50,000者，預期會有滯留現象。
 - 碘：所吸收的碘或體內存在的碘，其行為與經其他路徑吸收的碘大致相同。分佈體積約相當於體重（公斤）的38%。
- 碘幾乎完全經由腎臟路徑清除，清除率為15至60 毫升血漿 / 分鐘，視血清碘濃度與肌酸酐清除率而定。

4.3 臨床前安全性資料

- 急性毒性：在動物實驗（小鼠、大鼠、兔子、狗）中，只有在全身性施用（口服、皮下注射、靜脈注射）極高劑量時，才會出現急性毒性作用。
- 慢性毒性：亞慢性與慢性毒性試驗，已在大鼠與其他動物進行；以povidone-iodine混合劑（含10%可用碘）形式加入飼料中，使用劑量為一天75至750毫克 / 公斤體重的povidone-iodine，最多持續12週。在停止添加povidone-iodine之後，僅觀察到幾乎完全可逆且具劑量相關性的血清PBI（與蛋白質結合之碘）升高，以及非專一性的甲狀腺組織病變。類似的變化亦發生在對照組（接受含有等量碘的碘化鉀，而非povidone-iodine）。
- 致突變性與腫瘤發生性：已排除povidone-iodine具有致突變性的可能性。尚未進行致癌性試驗，因此尚無相關資訊。
- 生殖毒性：因為碘可通過胎盤，而且胎兒對藥劑量的碘具敏感性，因此懷孕期間不可吸收大量的碘。在產科使用povidone-iodine，可能會導致母親血清中的碘濃度顯著增高，亦可能導致新生兒出現暫時性甲狀腺機能低下與TSH（甲狀腺促進激素）濃度升高。此外，母乳中的碘濃度較血清中為高。

5. 藥物特性

5.1 賦形劑：甘油、薄荷醇（menthol）、尤加利精油（eucalyptus oil）、碘化鉀、純水。

5.2 不相容性：當鹼性物質、過氧化氫、牛磺羅定（taurolidine）、鞣酸（tannic acid）、乙醯水楊酸（阿斯匹靈）、銀、鉍與汞鹽存在時，povidone-iodine的活性會降低。

5.3 有效期限：3年。保存期限：標示於外盒。

5.4 特殊儲存注意事項：本產品應儲存於25°C或更低溫度。

5.5 容器性質與內容物：裝在附有白色噴閥與聚乙烯透明蓋子的淡黃色聚乙烯容器中，外以印刷紙盒包裝。包裝大小：50ml

5.6 使用 / 操作說明：無說明。

製造廠

製造廠名稱：Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

製造廠地址：13, Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus

國內持有者藥商

藥商名稱：台灣萌蒂藥品有限公司

藥商地址：臺北市信義區松仁路32號14樓

TW #026339-PIL v2

10215603

新版仿單

一般消費者用

必達定® 殺菌口腔噴液 BETADINE® Throat Spray

衛部藥輸字第026339號
醫師藥師藥劑生指示藥品

本仿單載有重要須知，請詳讀仿單內容。若您需要進一步資訊，請洽詢醫師或藥師。
您可能需要再次閱讀本仿單，因此請妥善保存。

【有效成分及含量】 Povidone-Iodine 0.45% w/v
【其他成分(賦形劑)】 Glycerin, Ethanol, Menthol, Eucalyptus oil, Potassium Iodide, Purified Water.

【用途(適應症)】 口腔消毒殺菌。

【使用上注意事項】

- ✓ 有下列情形者，請勿使用
 - (1) 對碘或本藥成分過敏的人。
 - (2) 甲狀腺功能異常的人。
 - (3) 接受放射碘治療之前4週與之後。
 - (4) 進行診斷性甲狀腺檢查前後1~2週內。
 - (5) 進行放射碘核醫影像檢查。
 - (6) 正在服用鋰劑的人。
 - (7) 未滿6歲之兒童。
- ✓ 有下列情形者，請洽醫生診治
 - (1) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 腎功能不全的人。
- ✓ 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - (1) 同時使用含有酵素成分、過氧化氫(雙氧水)、消毒劑、牛磺羅定或含銀的產品。
 - (2) 同時使用含汞產品。
- ✓ 其他使用上注意事項
 - (1) 本品僅可用於口腔及喉嚨。
 - (2) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (3) 避免陽光直射。
 - (4) 勿超過建議使用量。
 - (5) 使用本藥可能會影響糞便潛血或血尿檢驗之結果。

【用法用量】

六歲以上	局部(口腔與喉嚨)使用 直接噴液2~3下於疼痛及發炎的部位，每3~4小時重複一次，每天可使用數次，或依照醫師或牙醫指示。
未滿六歲	請勿使用
◆若您忘記使用藥物，請儘快使用，再依照原先使用時間使用。但若已經接近下次使用的時間，則跳過不用，下次恢復正常時間使用。 ◆治療時間應由您的醫師依據您的情況決定。	

【警語】

✓ 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
內分泌系統	甲狀腺機能亢進(脈搏加快或躁動、不安感)。 甲狀腺機能過低。
呼吸系統	肺炎
皮膚	皮膚過敏(有發癢、發紅、水泡、灼熱感或類似症狀)、血管性水腫
口腔	黏膜刺激、過敏反應。

✓ 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- (1) 急性全身過敏反應，如：血壓下降及/或呼吸急促等現象，急性皮膚或黏膜腫脹。
- (2) 碘使用過量可能引發口中金屬味、唾液增加、口腔或喉嚨灼熱或疼痛、眼部刺激與腫脹、因肺水腫導致呼吸困難、皮膚反應、腸胃不適與腹瀉、代謝性酸中毒、高血鈉症，並可能導致腎功能障礙。

【包裝】

- ◆ 50毫升圓形塑膠瓶裝，附有白色噴頭及透明蓋子。
- ◆ 保存於25°C以下。

製造廠

製造廠名稱：Mundipharma Pharmaceuticals Ltd
製造廠地址：13, Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus

國內持有者藥商

藥商名稱：台灣萌蒂藥品有限公司
藥商地址：臺北市信義區松仁路32號14樓



TW #026339-PIL v2

10215604

10215604v01

