

副本

衛生福利部中央健康保險署 公告

10452


臺北市中山區民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年3月23日

發文字號：健保審字第1090035101號

附件：給付規定修訂對照表(請至本署全球資訊網下載)



主旨：公告修訂糖尿病用藥含Liraglutide（如Victoza）、dulaglutide（如Trulicity）、lixisenatide（如Lyxumia）成分之藥品給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第5節 激素及影響內分泌機轉藥物Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.1.3.2 Liraglutide（如Victoza）、dulaglutide（如Trulicity）、lixisenatide（如Lyxumia）」部分規定，給付規定修訂對照表如附件。（附件電子檔已置於本署全球資訊網（<http://www.nhi.gov.tw>），路徑為：首頁>健保法令>最新全民健保法規公告，請自行下載）

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部心理及口腔健康司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業



公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、社團法人中華民國學名藥協會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本署資訊組（請刊登本署全球資訊網）、本署企劃組（請刊登健保電子報）、本署醫務管理組、本署各分區業務組（請轉知轄區醫事機構）、本署醫審及藥材組、臺灣諾和諾德藥品股份有限公司、臺灣禮來股份有限公司、賽諾菲股份有限公司

衛生福利部中央
健康保險署封章(3)

署長李伯璋



「藥品給付規定」修訂對照表

第5節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自109年5月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>5.1.3.2. Liraglutide (如 Victoza)、dulaglutide (如 Trulicity)、lixisenatide(如 Lyxumia) (101/10/1、105/5/1、105/8/1、107/4/1、107/7/1、<u>109/5/1</u>)</p> <p>1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及 / 或 sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續6個月之後，HbA1c 仍高於8.5%以上之第二型糖尿病患者： <u>(109/5/1)</u></p> <p>(1)<u>SGLT-2抑制劑</u> (2)<u>DPP-4抑制劑</u> (3)<u>SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品</u> (4)<u>Insulin</u></p> <p>2. 當患者已接受前述口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。</p>	<p>5.1.3.2. Liraglutide (如 Victoza)、dulaglutide (如 Trulicity)、lixisenatide(如 Lyxumia)(101/10/1、105/5/1、105/8/1、107/4/1、107/7/1)</p> <p>1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及 / 或 sulfonylurea 類藥物仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者。</p> <p>2. 當患者已接受口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。</p>

3. 發生重大心血管事件，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之病人，於接受過最大耐受劑量的 metformin 後，仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者，可考慮不須使用其他口服降血糖藥品而考慮使用 liraglutide 或 dulaglutide。
4. 本藥品不得與 DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。

3. 本藥品不得與 DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。

備註：劃線部份為新修訂規定