



## 「藥品給付規定」修訂對照表

## 第3節 代謝及營養劑 Metabolic &amp; nutrient agents

(自110年12月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>3.2.2. 活性維生素 D<sub>3</sub>製劑 (如 alfacalcidol ; calcitriol) 限下列病例使用 : (86/1/1、91/7/1、100/1/1、109/10/1、<u>110/12/1</u>)</p> <p>1. Vit. D 依賴型佝僂症或低磷血佝僂症。(應附醫學中心之診斷證明)</p> <p>2. 副甲狀腺機能低下症。(應檢附病歷影本)</p> <p>3. 慢性腎臟病引起之低血鈣症，並限 eGFR 小於 <u>45mL/min/1.73 m<sup>2</sup></u>，或 PTH-i 大於正常值三倍以上，血中鈣濃度在10.5mg/dL 以上病例不可使用，<u>每6個月須檢測病人血中鈣磷乘積，若血鈣*血磷&gt;55mg<sup>2</sup>/dL<sup>2</sup>者不可使用。</u> (109/10/1、<u>110/12/1</u>)。</p> <p>4. 停經後婦女患有脊椎壓迫性骨折或髖骨骨折病患。</p>	<p>3.2.2. 活性維生素 D<sub>3</sub>製劑 (如 alfacalcidol ; calcitriol) 限下列病例使用 : (86/1/1、91/7/1、100/1/1、109/10/1)</p> <p>1. Vit. D 依賴型佝僂症或低磷血佝僂症。(應附醫學中心之診斷證明)</p> <p>2. 副甲狀腺機能低下症。(應檢附病歷影本)</p> <p>3. 慢性腎不全引起之低血鈣症，並限腎臟功能失調(即 eGFR 小於 <u>30mL/min/1.73m<sup>2</sup></u>，或 PTH-i 大於正常值三倍以上)，血中鈣濃度在10.5 mg/dL 以上之病例不可使用。 (109/10/1)</p> <p>4. 停經後婦女患有脊椎壓迫性骨折或髖骨骨折病患。</p>

備註：劃線部分為新修訂規定